

Laserová epilace – kontraindikace zákroku

Laserová epilace je oblíbenou metodou, jak se zbavit nežádoucích chloupků, ale není vhodná pro každého. Existuje několik kontraindikací, které byste měli vzít v úvahu, než budete pokračovat v tomto postupu. Mezi hlavní kontraindikace patří stav těhotenství a přítomnost rakoviny. Doba remise po nádorovém onemocnění je v průměru asi 5 let a to po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Lidé užívající fotosenzibilizující nebo hormonální léky, jako je vitamin A (retinoidy) nebo izotretinoin, by měli dodržovat

interval 1 měsíc až 6 měsíců (v případě isotretinoinu) mezi koncem léčby a začátkem laserové epilace.

Laserové odstranění chloupků se také neprovádí během antibiotické léčby.

- Kontraindikací zákroku jsou kožní onemocnění, jako je lupénka, vitiligo nebo epidermální dysfunkce. Lidé, kteří se potýkají s problémem zarůstání chloupků a doprovodnými příznaky, jako jsou otoky, zarudnutí, podráždění nebo záněty, **však mohou těžit z ošetření laserovou epilací, které se v boji proti tomuto stavu ukazuje jako velmi účinné.**

- Pacienti s potvrzenou diagnózou epilepsie by se měli vyhnout laserovému odstranění chloupků.

Za pozornost stojí také fotosenzitivní látky, jako je třezalka tečkovaná nebo měsíček, kterým je třeba se vyhnout 7 dní před zákrokem.

- Velmi důležité je také vyhnout se laserovému odstranění chloupků na opálené pokožce a nevystavovat ošetřená místa slunečnímu záření po dobu 14 dnů po návštěvě salonu.

Absolutní kontraindikace - laserová epilace

- Nádorová onemocnění
- implantovaný defibrilátor nebo kardiostimulátor
- kovové implantáty
- Cukrovka
- chronická kožní onemocnění, např. vitiligo, lupénka, ichtyóza
- poruchy srážlivosti krve, užívání léků, které snižují srážlivost krve

- přecitlivělost na světlo
- tendence ke změně barvy nebo keloidům
- zrzavé, šedivé, blond vlasy – jsou kontraindikací v místě ošetření z důvodu nedostatku melaninu ve vlasovém folikulu (nedostatečná nebo velmi nízká účinnost léčby)

Relativní (dočasné) kontraindikace - laserová epilace

- Těhotenství a kojení
- opálení
- aktivní kožní infekce
- užívání antidepressiv, psychotropních léků, steroidů
- užívání tetracyklinových antibiotik
- laserová dermabrazie provedená v posledních třech měsících na povrchu odstranění chloupků
- některé dermokosmetické a chirurgické zákroky
- konzumace alkoholu (24 hodin před zákrokem)
- epilepsie